



**Objectif :** Limiter préventivement la propagation du black rot sur la vigne.

**Hypothèse :** la vitamine C contenue dans Assimil K Santé renforce les défenses naturelles de la vigne. De plus, les autres vitamines contenues dans le produit (acide folique et acide citrique) renforce la durée de vie de la vitamine C et donc son action à long terme.

Si l'on se réfère à la bibliographie, la vitamine C (antioxydant) agit préventivement contre le stress oxydatif induit par les oxydants ( $H_2O_2$ ,  $O_2^-$ , etc...) que synthétise naturellement la plante dans ses cellules en condition de stress (sécheresse, blessure, carence nutritive, forte salinité, forte luminosité, polluants, maladies, excès de nitrate, sol nu, travail du sol, le soleil agent principal d'activation du stress oxydatif, etc...).

### Rappel sur le black rot

Le black rot (*Guignardia bidwellii*, forme parfaite), maladie spécifique de la vigne, est originaire d'Amérique du Nord où le champignon responsable fut découvert en France pour la première fois en 1886. Il sévit avec plus ou moins de gravité dans tous les vignobles du monde. L'ascomycète responsable du black rot s'attaque à tous les organes herbacés, à condition de les contaminer à un stade précoce de leur développement.

#### 1. Cycle biologique

- Conservation hivernale

Le black-rot de la vigne se conserve en hiver sous forme de périthèces (ponctuations noires) sur les baies malades tombées au sol ou restées sur les grappes non récoltées.

- Contamination primaire

Au printemps, les asques contenus dans les périthèces s'ouvrent avec les pluies et libèrent des ascospores, responsables des contaminations primaires. L'apparition des symptômes survient après une période d'incubation de 7 à 25 jours selon les températures. Des tâches apparaissent sur les tissus parasités et se couvrent bientôt de pustules noires, les pycnides.


- Contamination primaire

Les pycnides sont responsables des contaminations secondaires par libération des pycniospores. La dissémination se fait autour des foyers primaires par les éclaboussures d'eau (« coup de fusil »).



Contaminations primaires et secondaires se superposent jusqu'à ce que les périthèces soient épuisés (mi-juillet) et que les organes ne soient plus réceptifs. En août, les infections ne sont plus possibles.

- Conditions favorables à la contamination de la vigne par le black rot

Comme la plupart des champignons, *Guignardia bidwellii* a besoin de douceur et d'humidité. Les conditions propices à l'infection sont une durée d'humectation minimale de 6 heures à des températures comprises entre 9 et 32°C, avec un optimum de 20-25°C.



Cycle biologique du black rot (source: INRA)



Source: ministère de l'agriculture du Canada

#### 2. Symptômes du black rot (de la forme parfaite: *Guignardia bidwellii*)

Le black-rot touche tous les organes de la vigne dans leur phase de croissance active. Les attaques les plus visibles se situent sur les feuilles.

Attention, le Black Rot peut s'exprimer sous différentes formes (parfaite et imparfaite), les symptômes présentés ici sont les plus caractéristiques mais pas les seuls!

- Sur les feuilles

Les attaques de black-rot prennent la forme de petites taches circulaires de 2 à 10 mm de diamètre, d'abord grises puis prenant une teinte « feuille morte », bordées par un liseré brun foncé. Rapidement des pustules noires se forment à la périphérie de la tache : ce sont les pycnides.



*Photo: D.Blanvard. INRA*

- Sur les rameaux

Plus rarement attaqués, les jeunes rameaux présentent des symptômes analogues à ceux des pétioles. On observe les mêmes taches brunes allongées qui se transforment en chancre brun porteur de spores.



*Photo: D.Blanvard. INRA*

- Sur les grappes

Les attaques de black-rot sur grappes interviennent généralement après la floraison. La contamination des baies se fait à partir des pycnides présentes sur les feuilles infectées situées au-dessus de la grappe.

La période de sensibilité des baies va de la nouaison au stade fermeture de la grappe. Elle diminue à la véraison avec l'augmentation du taux de sucre. Les baies ne peuvent plus être infectées à maturité.

On commence par observer des tâches circulaires. Celles-ci progressent et envahissent la baie en 2 ou 3 jours. Puis la partie atteinte de la baie s'affaiblit et se colore en brun-rouge.

Enfin, le fruit se dessèche et se momifie, prenant une couleur noire avec des reflets bleu violacé. Il se couvre de pustules (pycnides) et de périthèces qui lui donnent un aspect rugueux en fin d'été.

La gravité de l'attaque de black-rot peut aller de quelques baies atteintes à la grappe entièrement desséchée.



Photo: D.Blanvard. INRA




Photo: D.Blanvard. INRA

#### Responsable et localisation de l'essai

NOM	
PRENOM	
NOM DU DOMAINE	
CORDONNEES GPS	
ADRESSE	
COMMUNE	
CODE POSTAL	

#### Description de la parcelle d'essai

CEPAGE	
PORTE GREFFE	
AGE	
DENSITE (ceps / Ha)	
DISTANCE INTER-RANG	
DISTANCE ENTRE CEPS	
MODE DE TAILLE	
MODE DE DESHERBAGE	

#### Description, composition, dose, dates et conditions d'application d'Assimil K Santé

##### 1. Description d'Assimil K Santé

Assimil K Santé est un stimulant foliaire liquide composé d'un complexe d'oligo-éléments et de vitamines (vitamine C, acide folique, acide citrique) qui sont favorables à la santé de tous les végétaux.

Il a été conçu à partir des préconisations de Francis Chaboussou (INRA) selon le concept **B + 3M** et est autorisé en Agriculture Biologique.

Il peut être utilisé en lutte préventive contre le black rot.

## 2. Composition d'Assimil K Santé

Assimil K Santé (pH=3) est composé de :

- **10% de SO<sub>3</sub>.** Le Soufre est l'élément essentiel de la plupart des protéines au même titre que l'azote et le phosphore.
- **5% de MgO.** Le Magnésium jouent un rôle majeur dans le processus de photosynthèse car il est l'atome central de la chlorophylle.
- **1,7 % de Mn.** Le Manganèse joue un rôle majeur dans la photosynthèse, la respiration et l'assimilation d'azote. Il est aussi impliqué dans l'elongation des cellules racinaires et la résistance aux maladies racinaires.
- **0,3% de B.** Le Bore agit sur la translocation des sucres et des glucides, le métabolisme de l'azote, la formation de certaines protéines, la régulation des niveaux d'hormones et le transport du potassium vers les stomates. Il aide à réguler l'équilibre hydrique interne.
- **0,002% de Mo.** Le Molybdène joue un rôle important dans la réduction du nitrate dans les feuilles. Il est associé aussi au métabolisme du fer et du phosphore.
- **Acide Ascorbique.** L'Acide Ascorbique ou Vitamine C agit sur la croissance et le développement de la plante, en tant que cofacteur pour de nombreuses enzymes impliquées dans la photosynthèse et la biosynthèse d'hormones, comme antioxydant (donneur d'électrons) et il joue un rôle de défense contre les pathogènes et dans la régulation de la floraison.
- **Acide folique et acide citrique.** Ils renforcent la durée de vie de la vitamine C et son action réductrice à long terme.

Globalement, Assimil K Santé :

- favorise la photosynthèse et la protéosynthèse,
- permet à la plante de résister aux stress,
- prévient les risques de black rot,
- optimise le rendement et la qualité des récoltes.

## 3. Dose, dates et conditions d'application d'Assimil K Santé

La **dose** d'application d'Assimil K Santé recommandée est de **2 à 3 l/ha**.

Les **dates** d'application d'Assimil K Santé seront les mêmes que pour les traitements anti-black rot réalisés par le viticulteur.

Les UV du soleil ainsi que l'oxygène pouvant neutraliser l'effet réducteur de la Vitamine C, certaines **conditions d'application** d'Assimil K Santé doivent être appliquées pour maximiser ses effets:

- pulvériser soit le matin ou le soir à l'abri du soleil,
- ne pas utiliser de buses anti dérives (excès d'oxygène),
- pulvériser à bas volume (<100 l/ha ou avec le moins d'eau possible),
- utiliser de l'eau déminéralisée (ou eau de pluie filtrée) pour préparer la bouillie, la corriger à pH=3 avec de l'acide citrique, puis rajouter Assimil K Santé.

Les doses et dates d'application des produits anti-black rot utilisés par le vigneron et d'Assimil K Santé seront retranscrites dans le tableau que vous trouverez en **Annexe n°1a** et les conditions d'application d'Assimil K Santé en **Annexe n°1b**.

### **Remarques préalables avant la mise en place de l'essai :**

- TOUS LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES SUR LA MODALITE « ASSIMIL K SANTE » SONT A PROSCRIRE,**
  - Nous ne réaliserons pas cette année une expérimentation agronomique au sens strict du terme,
  - La sensibilité de la parcelle au black rot doit être moyenne à importante les années précédentes,
  - L'essai doit se réaliser sur les mêmes cépages,
  - Les observations réalisées sur la modalité Témoin se feront à côté des observations effectuées sur la modalité « Assimil K Santé ».

### **Dispositif expérimental de l'essai**

Cette année, nous allons faire un essai simple avec deux modalités sans répétition pour valider ou non l'effet préventif d'Assimil K Santé sur le black rot et ainsi en dégager les grandes tendances pour un certain nombre de domaine viticole aux pratiques agricoles diverses.

Les deux modalités sont :

- une modalité « Témoin » qui représente la pratique traditionnelle du viticulteur en terme de traitement préventif et curatif de sa vigne contre le black rot,
- une modalité « Assimil K Santé » qui sera utilisée en traitement préventif contre le black rot (sur cette modalité, seul Assimil K Santé sera utilisé en lutte contre le black rot et **TOUS LES AUTRES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES SERONT A EXCLURE**).

Le nom et la composition des traitements utilisés pour la lutte « classique » contre le black rot (modalité « Témoin ») seront retranscrits dans le tableau de l'**Annexe n°1a**.

### **Fertilisation de la Vigne**

Le tableau de renseignement concernant vos pratiques en terme de fertilisation pour la saison 2020 est présent en **Annexe n°2**. Son remplissage doit être le plus complet possible.

### **Protection phytosanitaire de la Vigne**

Le tableau de renseignement concernant vos pratiques en terme de protection phytosanitaire de votre vignoble pour la saison 2020 est présent en **Annexe n°3**. Son remplissage doit être le plus complet possible.

### **Analyse de sol**

Avez-vous une analyse de sol récente (moins de 5 ans) ? Si oui, pouvez-vous nous la communiquer par mail à l'adresse suivante: [xavier.sarda@lbv-france.com](mailto:xavier.sarda@lbv-france.com).  
Les analyses plus vieilles sont également bienvenues.

#### Observations et notations à réaliser au cours de l'essai

##### 1. Black rot

Les observations et notations seront réalisées sur les deux modalités à quatre stades phénologiques différents sur les feuilles et les grappes (Stade selon Baggiozini ou Eichhorn & Lorenz ou BBCH, Cf Annexe n°5, 6 et 7):


- ✓ Au stade Boutons floraux agglomérées (Stade G ou 15 ou 55). Les grappes s'espacent et s'allongent sur la pousse. Les boutons floraux sont encore agglomérés.




- ✓ Au stade Nouaison (Stade J ou 27 ou 71). Ovaire commençant à grossir. Les étamines flétries restent souvent fixées à leur point d'attache.



- ✓ Au stade Fermeture de la grappe (Stade L ou 31 ou 77). Les baies atteignent une taille suffisante pour se toucher.



- ✓ Au stade Véraison (Stade M ou 35 ou 85). Les baies s'éclaircissent pour le raisin blanc ou se colorent pour le raisin noir.



A chacun des stades décrits précédemment et pour les deux modalités, en se déplaçant dans les rangs une estimation visuelle globale sera réalisée sur les feuilles et les grappes selon l'échelle suivante :

- 0 : pas de black rot,
- 1 : environ 25% de black rot présent sur la modalité,
- 2 : environ 50% de black rot présent sur la modalité,
- 3 : environ 75% de black rot présent sur la modalité,
- 4 : environ 100% de black rot présent sur la modalité.

Les résultats des observations seront retranscrits dans l'**Annexe n°4**.

## 2. Rendement

Sur un rang par modalité (de préférence le rang du milieu), on pèse l'ensemble des grappes de raisin récoltées. Grâce à la densité de plantation, on en déduit le rendement de grappe de raisin en kg/ha. Les données seront retranscrites dans le tableau ci-dessous :

MODALITES	RENDEMENT POUR UN RANG RECOLTE (kg)	NOMBRE DE CEPS RECOLTES	LONGUEUR DU RANG RECOLTE (m)
Témoin			
Assimil K Santé			

### 3. Azote total et taux de sucre dans le moût de raisin

Si vous réalisez les dosages d'azote total et de taux de sucre dans vos moûts de raisin, vous pouvez remplir le tableau ci-dessous :

MODALITES	AZOTE TOTAL (g/l)	TAUX DE SUCRE (g/l)
Témoin		
Assimil K Santé		

### Contact fournisseur Assimil K Santé

SARL Sidler concept - Angela Sidler  
Le Moulin Guérin  
61140 Rives d'andaine  
Tel.: 06.67.58.58.74  
Email: sidlerconcept@gmail.com

**Fiche technique**  
  
**Stratégie Assimil K Santé**  
**Protocole d'expérimentation**  
**Annexes**

**Annexe n°1a**

Modalité Témoin		Modalité Assimil K Santé				
Non commercial du produit	Composition du produit	Date d'application (l/ha ou g/ha)	Nombre de rangs traités	Dose (l/ha) ou g/ha)	Date d'application (l/ha)	Nombre de rangs traités (m)
1 <sup>ère</sup> application						
2 <sup>ème</sup> application						
3 <sup>ème</sup> application						
4 <sup>ème</sup> application						
5 <sup>ème</sup> application						
6 <sup>ème</sup> application						
7 <sup>ème</sup> application						
8 <sup>ème</sup> application						
9 <sup>ème</sup> application						
10 <sup>ème</sup> application						
11 <sup>ème</sup> application						
12 <sup>ème</sup> application						

# Fiche technique



## Stratégie Assimil K Santé

### Protocole d'expérimentation

### Annexes

#### Annexe n°1b

	Conditions d'application d'Assimil K Santé				
	<i>Heure de traitement</i>	<i>Type de buse utilisée</i>	<i>Voume de bouillie (l/ha)</i>	<i>pH bouillie</i>	<i>Correcteur utilisé pour acidifier la bouillie</i>
1 <sup>ère</sup> application					
2 <sup>ème</sup> application					
3 <sup>ème</sup> application					
4 <sup>ème</sup> application					
5 <sup>ème</sup> application					
6 <sup>ème</sup> application					
7 <sup>ème</sup> application					
8 <sup>ème</sup> application					
9 <sup>ème</sup> application					
10 <sup>ème</sup> application					
11 <sup>ème</sup> application					
12 <sup>ème</sup> application					

**Annexe n°2**

Nom du fertilisant	Date d'application	Nature (chimique ou organique)	Composition du fertilisant (teneur en N, P, K, S, Mg, Ca, ...)	Dose (kg/ha, m <sup>3</sup> /ha ou l/ha)
1 <sup>ère</sup> passage				
2 <sup>ème</sup> passage				
3 <sup>ème</sup> passage				
4 <sup>ème</sup> passage				
5 <sup>ème</sup> passage				
6 <sup>ème</sup> passage				
7 <sup>ème</sup> passage				
8 <sup>ème</sup> passage				

**Fiche technique**  
  
**Stratégie Assimil K Santé**  
**Protocole d'expérimentation**  
**Annexes**

**Annexe n°3**

	Nom du produit phytosanitaire	Date d'application	Famille (herbicide, fongicide, insecticide). Autre, précisez:	Composition du produit phytosanitaire (matière active)	Cible(s)	Dose (kg/ha ou l/ha)
1 <sup>ère</sup> application						
2 <sup>ème</sup> application						
3 <sup>ème</sup> application						
4 <sup>ème</sup> application						
5 <sup>ème</sup> application						
6 <sup>ème</sup> application						
7 <sup>ème</sup> application						
8 <sup>ème</sup> application						
9 <sup>ème</sup> application						
10 <sup>ème</sup> application						
11 <sup>ème</sup> application						
12 <sup>ème</sup> application						
13 <sup>ème</sup> application						
14 <sup>ème</sup> application						
15 <sup>ème</sup> application						

**Annexe n°4**

Stades phénologiques d'observation du black rot						
Modalités	Boutons floraux agglomérées			Fermerture de la grappe		
	Feuilles	Grappes	Feuilles	Grappes	Feuilles	Grappes
	Témoin					
Assimil K Santé						

# Fiche technique




## Stratégie Assimil K Santé

### Protocole d'expérimentation

### Annexes

#### Annexe n°5

Stades phénologiques repères de la vigne selon Baggiozini (en lettres) et selon la classification internationale (BBCH) (Source : Alain Reynier, Manuel de viticulture)



A Bourgeon d 'hiver  
BBCH 00

B Bourgeon dans le coton  
BBCH 05

C Pointe verte  
BBCH 09

D Sortie des feuilles  
BBCH 10



E Feuilles étalées  
BBCH 12

F Grappes visibles  
BBCH 53

G Boutons floraux agglomérés  
BBCH 55

H Boutons floraux séparés  
BBCH 57




I Floraison  
BBCH 65

J Nouaison  
BBCH 71

K Petit pois  
BBCH 75

L Fermeture de la grappe  
BBCH 77



M Véraison  
BBCH 83-85

N Maturité  
BBCH 89

O Aoûtement  
BBCH 91

P Chute des feuilles  
BBCH 97

# Fiche technique



## Stratégie Assimil K Santé


### Protocole d'expérimentation

### Annexes

#### Annexe n°6

##### Stades phénologiques repères de la vigne selon Eichhorn & Lorenz

(Source : Coombe, 1995)



#### Annexe n°7

**Stades phénologiques repères de la vigne selon la classification internationale BBCH.**  
 (Source : Lorenz et al., 1994)

Code	Définition
------	------------

#### **Stade principal 0: bourgeonnement ou débourrement**

00	dormance: les bourgeons d'hiver sont pointus à arrondis, suivant la variété ils sont brun clair à foncé et les écailles sont plus ou moins appliquées aux bourgeons
01	début du gonflement des bourgeons: les bourgeons s'allongent à l'intérieur des écailles
03	fin du gonflement des bourgeons, les bourgeons ne sont pas encore verts
05	«stade de la bourre»: une protection cotonneuse est nettement visible
07	début de l'éclatement des bourgeons (débourrement): l'extrémité verte de la jeune pousse est juste visible
09	débourrement: l'extrémité verte de la jeune pousse est nettement visible

#### **Stade principal 1: développement des feuilles**

11	première feuille étalée et écartée de la pousse
12	2 feuilles étalées
13	3 feuilles étalées
1 .	et ainsi de suite ...
19	9 ou davantage de feuilles sont étalées

#### **Stade principal 5: apparition des inflorescences**

53	les grappes (inflorescences) sont nettement visibles
55	les grappes augmentent de taille, les boutons floraux sont agglomérés
57	les grappes sont bien développées, les fleurs se séparent

#### **Stade principal 6: la floraison**

60	les premiers capuchons floraux se séparent du réceptacle
61	début de la floraison: 10% des capuchons floraux sont tombés
62	20% des capuchons floraux sont tombés
63	floraison partielle: 30% des capuchons floraux sont tombés
64	40% des capuchons floraux sont tombés
65	mi-floraison: 50% des capuchons floraux sont tombés
66	60% des capuchons floraux sont tombés
67	70% des capuchons floraux sont tombés
68	la floraison s'achève: 80% des capuchons floraux sont tombés
69	fin de la floraison

Code	Définition
<b>Stade principal 7: développement des fruits</b>	
71	nouaison: début du développement des fruits, toutes les pièces florales sont tombées
73	les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas
75	les baies ont la grosseur de petit-pois, les grappes sont en position verticale
77	début de la fermeture de la grappe (les baies commencent à se toucher)
79	la fermeture de la grappe est complète, les fruits ont fini de grossir
<b>Stade principal 8: maturation des baies</b>	
81	début de la maturation: les baies commencent à s'éclaircir et/ou à changer de couleur
83	éclaircissement et/ou changement de couleur en cours
85	véraison: les baies deviennent molles au toucher
89	les baies sont mûres pour la vendange
<b>Stade principal 9: sénescence ou début du repos végétatif</b>	
91	après la vendange: l'aoûttement du bois est terminé
92	début de la coloration des feuilles
93	début de la chute des feuilles
95	50% des feuilles sont tombées
97	fin de la chute des feuilles
99	baies mûres en phase de conservation

**Fiche technique**  
Stratégie Assimil K Santé  
Protocole d'expérimentation  
*Annexes*

